



Dziubałek nadrzewny

Anthocoris nemoralis



BIOLOGICZNA METODA ZWALCZANIA MIODÓWEK NA DRZEWACH I KRZEWACH OWOCOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI MIODÓWKI GRUSZOWEJ W UPRAWIE GRUSZ.

- **Skuteczna kontrola:** Dziubałek nadrzewny zwalcza szeroki zakres miodówek w tym miodówki (*Psylla*, *Cacopsylla*) atakujące grusze, a także inne miodówki atakujące drzewa i krzewy owocowe i ozdobne.
- **Naturalny drapieżnik:** Bezpieczny dla środowiska, ludzi i zwierząt, naturalnie występujący w środowisku.
- **Długotrwałe działanie:** Dziubałek nadrzewny rozmnaża się na uprawie, zapewniając długotrwałą ochronę.
- **Całoroczna ochrona:** W polskim klimacie dziubałek nadrzewny jest aktywny przez cały sezon.
- **Zwalcza wszystkie stadia szkodników:** Dziubałek nadrzewny żywi się jajami, larwami, nimfami i dorosłymi osobnikami miodówek.



Organizm pożyteczny:
Dziubałek nadrzewny
(*Anthocoris nemoralis*)

Forma produktu:
butelka zawierająca osobniki dorosłe

Opakowania:
200 szt
500 szt

Przechowywanie:
w chłodnym miejscu (8–10°C),
aplikować zaraz po otrzymaniu

Dziubałek nadrzewny (*Anthocoris nemoralis*) - CHARAKTERYSTYKA

Wygląd:

Dorośle osobniki osiągają wielkość 3-4 mm. Mają czarne ciało z brązowymi i szarymi plamami na skrzydłach. Młode stadia są początkowo żółtawe, a następnie stają się coraz bardziej czerwone i brązowe.

Wszystkie ruchome stadia mają aparat gębowy typu kłująco-ssącego, którym wysysają miodówki, ale także inne drobne owady i roztocza.



Biologia: Dziubałek nadrzewny jest pospolity w całej Europie. Jest naturalnie związany z gruszkami, gdzie może spędzać całe życie, zimując na pniach, w spękaniach kory.

W temperaturze 25°C rozwój od jaja do dorosłego osobnika trwa około 4 tygodnie, a długość życia dorosłego osobnika może wynosić do 2 miesięcy. W ciągu roku występują zazwyczaj trzy pokolenia.



Aplikacja i dawkowanie

Forma produktu i aplikacja: Dziubałek nadrzewny dostępny jest w formie postaci dorosłych, zamkniętych w plastikowej butelce wraz z nośnikiem.

Ważne! Butelkę przed użyciem należy **delikatnie** odwrócić w celu wymieszania zawartości (pożytecznych owadów oraz nośnika – łusek gryki).

Następnie należy butelkę odkręcić i rozprowadzić na powierzchni uprawy używając do tego celu równomiernie rozłożonych pojemników do uwalniania.



Zastosowanie i dawka:

Wprowadzanie dziubałka nadrzewnego do uprawy gruszy powinno rozpocząć się, gdy miodówka zaczyna być aktywna wczesną wiosną.

1500 do 5000 osobników dorosłych dziubałka nadrzewnego na 1 ha sadu gruszonego, należy wprowadzać w 2-4 aplikacjach.

W przypadku roślin ozdobnych wprowadzenie można przeprowadzić jednorazowo, uwalniając kilkadziesiąt drapieżników, dostosowując dawkę zgodnie z rozmiarem drzew lub krzewów.

Dawkowanie zależy od rodzaju uprawy i nasilenia występowania szkodnika. Skontaktuj się z naszym doradcą, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące dawkowania dla Twojej uprawy.

Przechowywanie i bezpieczeństwo dziubałków

Butelki z drapieżnikami należy przechowywać w ciemnym i zimnym miejscu (8-10°C). Aplikować natychmiast po ich otrzymaniu.

Unikać kontaktu z nieselektywnymi pestycydami.